

RESUMEN DEL PROGRAMA

HEMORRAGIA POSTPARTO

PANORAMA GENERAL

La hemorragia posparto (HPP) constituye la principal causa de muertes maternas en todo el mundo, de las cuales más de una cuarta parte ocurre en regiones de escasos recursos.

Gynuity Health Projects, en colaboración con distintos organismos asociados, realiza investigación clínica y programática, genera y sintetiza evidencias para orientar el diseño de políticas y prácticas y ofrece asistencia técnica a gobiernos y otros actores clave a fin de llenar los vacíos en la atención a la HPP.

Aplicamos evidencias clínicas y experiencia programática al diseño y evaluación de la prestación de servicios y enfoques de programas encaminados a:


- a) Mejorar la disponibilidad y utilización de tecnologías para el manejo de la HPP y
- b) Facilitar el tratamiento oportuno y eficaz de la HPP en distintos niveles de atención.



Nos centramos en tecnologías e intervenciones sencillas que resultan apropiadas y útiles para escenarios comunitarios y de recursos limitados.

DÓNDE TRABAJAMOS

En el siguiente mapa se señalan los países donde llevamos a cabo estudios de investigación y proporcionamos asistencia técnica en HPP. Al día de hoy, más de 65 mil mujeres han participado en nuestros estudios.



INVESTIGACIÓN

Papel del Misoprostol en el Manejo de la HPP

Los medicamentos uterotónicos producen contracciones del útero después del parto y ayudan a controlar el sangrado ocasionado por atonía uterina, misma que constituye la causa más común de HPP. El misoprostol, medicamento de bajo costo y de gran disponibilidad, se consigue en tabletas, es estable a temperatura ambiente y para usarlo no se requiere adiestramiento, equipo ni instalaciones especiales. Estas características lo convierten en un importante elemento del paquete integrado de intervenciones para HPP, en especial en comunidades y lugares de pocos recursos. Se considera una valiosa alternativa a la oxitocina (el agente uterotónico por excelencia, de administración intravenosa o intramuscular, que requiere almacenamiento en frío y proveedores calificados).

Evidencia clínica: Prevención y tratamiento de la HPP con misoprostol

Las evidencias derivadas de distintos ensayos clínicos que evaluaron el uso de misoprostol para el tratamiento de la HPP han contribuido a mejorar los conocimientos existentes en seguridad, eficacia y efectividad programática del medicamento.

Uso del Misoprostol para el Manejo de la HPP: Esquemas Terapéuticos Basados en Evidencia

Prevención: Dosis única de 600 mcg de misoprostol por vía oral (3 tabletas)

Tratamiento: Dosis única de 800 mcg de misoprostol por vía sublingual (4 tabletas)

- En un ensayo donde se comparó placebo y misoprostol (600 mcg por vía oral) se encontró que este último disminuyó la incidencia de HPP medida (≥ 500 cc) en una cuarta parte en mujeres a quienes se les administró de manera profiláctica por parteras tradicionales capacitadas, después de dar a luz en su casa, en un área remota de Pakistán. En otro ensayo donde se comparó el misoprostol y la oxitocina (en Uniject™) para la prevención de la HPP, se encontró que los dos fármacos son seguros y eficaces cuando los administran asistentes de parteras en áreas rurales de Senegal. Por su facilidad de uso, mayor aceptabilidad y menores retos logísticos, el misoprostol constituye una opción más adaptable a ese tipo de escenario. Desde entonces, Senegal aprobó el uso a nivel nacional del misoprostol administrado por asistentes de parteras para la prevención de la HPP en puestos rurales de salud.
- Por medio de dos estudios realizados en varios países y con gran número de participantes para comparar el misoprostol (800 mcg por vía sublingual) y la oxitocina intravenosa (40 UI) en el tratamiento de la HPP, se encontró que en 9 de cada 10 mujeres se controlaba el sangrado dentro de los primeros 20 minutos con cualquiera de los dos medicamentos. Un hallazgo inesperado de los estudios fue la presencia frecuente de episodios de fiebre elevada después de la administración del misoprostol en sólo uno de los países, situación que llevó a realizar mayor investigación para entender los efectos secundarios de dicho medicamento y específicamente la razón por la cual en algunos lugares se observa mayor incidencia de fiebre. Un tercer estudio efectuado en distintos países con la colaboración de la OMS no reveló beneficios clínicos al administrar simultáneamente el misoprostol y la oxitocina para el tratamiento de la HPP.

Esfuerzos para traducir evidencia clínica en prácticas: Modelos de atención de la HPP usando misoprostol

Actualmente se lleva a cabo investigación a nivel comunitario para esclarecer las distintas maneras en que se puede integrar el misoprostol a los programas de HPP. Entre los modelos de atención que utilizan misoprostol a dicho nivel se encuentran:

- La distribución antenatal de misoprostol a mujeres embarazadas para su autoadministración después de dar a luz en casa para prevenir la HPP.
- Oferta de misoprostol por parte de proveedores de bajo nivel para la prevención de la HPP en lugares de acceso limitado a uterotónicos inyectables estándar.
- Junto con la remisión de las mujeres a servicios de salud, se reconoce como tratamiento de 'primeros auxilios' el uso de una dosis sublingual de 800 mcg de misoprostol administrado después de un parto en casa/puesto de salud comunitario e inmediatamente después de sangrado intenso.
- Profilaxis universal (600 mcg de misoprostol oral) seguida de tratamiento con dosis sublingual única de 800 mcg de misoprostol en caso de presentarse HPP.
- Prevención secundaria. Tratamiento temprano con una dosis de 800 mcg de misoprostol sublingual para mujeres con pérdida de sangre superior al promedio en el posparto.



Políticas e incidencia

Conjuntamente con los organismos con quienes nos hemos asociado, trabajamos para promover cambios basados en evidencia que modifiquen políticas y prácticas de ámbito nacional e internacional. Entre las actividades que realizamos se encuentran:

- Divulgación de resultados de investigación en artículos de revistas arbitradas y mediante presentaciones en webinarios, reuniones y conferencias.
- Preparación y presentación – para su posterior aprobación – de solicitudes de inclusión del misoprostol para el tratamiento y la prevención de la HPP en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS.
- Desarrollo de materiales informativos y educativos, entre ellos las 'Instrucciones de uso'.
- Elaboración de comunicados (impresos y en video) que presenten los distintos contextos de prestación de servicios y enfoques de atención a la HPP.
- Apoyo y contribución al desarrollo de lineamientos de ámbito nacional y mundial basados en las mejores evidencias disponibles.
- Colaboración con compañías farmacéuticas para expandir la disponibilidad del misoprostol para la HPP.

Orientación para el esclarecimiento del papel del misoprostol

OMS: Recomendaciones para la prevención y el tratamiento de la HPP, 2012

FIGO: Prevención y tratamiento de la HPP en escenarios de bajos recursos, 2012

ICM y FIGO: Uso de misoprostol para el tratamiento de la HPP en escenarios de bajos recursos, 2014

Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS (19^a edición, 2015): Se lista el misoprostol para el tratamiento y la prevención de la HPP

Agencia Europea de Medicamentos: Aprobación del primer producto de misoprostol, el hemoprostol, para el tratamiento de la HPP, 2014

Cuando los Uterotónicos No Bastan: Estrategias Adicionales para Cerrar las Brechas en la Atención a la HPP

El uso exclusivo de uterotónicos no basta para erradicar la morbilidad y mortalidad derivadas de la HPP y por ello, realizamos investigación colaborativa para entender el papel de estrategias e intervenciones adicionales que podrían cerrar las brechas de la atención a la HPP. Actualmente, evaluamos:

- *La efectividad, seguridad, viabilidad y aceptabilidad de introducir un tipo de taponamiento uterino con balón y condón, de bajo costo y armado localmente, para el manejo de la HPP en centros de atención a donde se remita a las pacientes.* Dicha opción terapéutica podría disminuir la necesidad de efectuar intervenciones tales como los procedimientos quirúrgicos, que a menudo no son de disposición inmediata o no resultan viables fuera de centros de atención terciaria.
- *La eficacia y seguridad del ácido tranexámico (TXA) administrado por vía oral como complemento del misoprostol para el tratamiento de la HPP.* El uso del agente antifibrinolítico TXA podría controlar el sangrado en mujeres que no respondan al tratamiento con uterotónicos y/o pudieran presentar HPP asociada a trauma. Por su amplia disponibilidad en forma de tabletas y su estabilidad a temperatura ambiente, el TXA se podría utilizar como parte de un paquete de opciones de tratamiento de la HPP en centros de salud de nivel bajo y en nacimientos atendidos en el hogar.
- *La relación entre el índice de shock y la pérdida de sangre para identificar nuevas medidas clínicas de HPP y indicadores de tratamiento.* La definición más común de HPP es pérdida de sangre de 500 ml o más. Sin embargo, calcular visualmente el volumen perdido puede resultar difícil y se ha cuestionado la utilidad clínica del marcador de los 500 ml. Los indicadores clínicos de HPP que no dependen de la medición del volumen de sangre perdida podrían constituir un factor para el mejoramiento y la simplificación de la identificación y el manejo de la HPP.
- *La efectividad de la atención a la HPP.* Entender mejor de qué manera se proporciona ese tipo de atención podría ser factor crucial en el mejoramiento de los resultados de la HPP. Sin embargo, existe poca información sobre los elementos requeridos para mejorar la efectividad del manejo de la HPP o la forma de priorizar dichos cambios a todo nivel de un sistema de salud.



ASISTENCIA TÉCNICA

Evaluación de los Aspectos Útiles de los Esfuerzos de Escalamiento a Nivel Nacional

Colaboramos con distintos gobiernos para ayudarles en el diseño, la implementación y la evaluación de innovaciones y políticas en materia de prestación de servicios. Dichos esfuerzos nos han permitido compartir las lecciones aprendidas de evaluaciones de programas de nivel nacional en países como Nepal, Níger y Senegal. Asimismo, nuestras evaluaciones ofrecen orientación importante a otros países interesados en mejorar la calidad de sus programas de HPP.

ORGANISMOS ASOCIADOS A NIVEL MUNDIAL

Nos asociamos con actores gubernamentales (entre ellos las Secretarías de Salud), expertos y distintas agencias para alcanzar los objetivos establecidos en este programa. A continuación se listan algunos de nuestros asociados clave.

- Asociación Educativa del Distrito Liberal de Bijapur, India
- Centro de Investigación y Consultoría en Salud Reproductiva, Vietnam
- Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP), Argentina
- ChildFund International
- Comité Nacional de Salud Materna y Neonatal, Pakistán
- Concept Foundation
- Escuela de Medicina Jawaharlal Nehru de la Universidad KLE, India
- FCI Program of Management Sciences for Health
- Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
- Guttmacher Institute
- Health and Development International
- Hospital Escuela El Galaa, Egipto
- Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos
- Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Population Services International (PSI)
- Servicios de Salud de Aga Khan
- Universidad de Alejandría, Egipto
- Universidad de California, San Francisco
- Universidad de Illinois, Chicago, Estados Unidos
- Universidad de Liverpool, Reino Unido

RECURSOS RELACIONADOS

Producimos materiales acerca de la HPP en distintos idiomas y dirigidos a públicos diversos, entre ellos mujeres, diseñadores de políticas, implementadores de programas, proveedores de salud y defensores y promotores de la salud de las mujeres. Esta publicación viene acompañada de un prospecto que lista más de 25 artículos sobre HPP que se han publicado en revistas arbitradas desde 2005. Encontrará más recursos sobre HPP y sobre otros temas de salud de las mujeres en nuestro sitio web www.gynuity.org y en [YouTube](https://www.youtube.com/gynuity). También nos puede seguir en Twitter @Gynuity.

Actualizado en abril de 2016

RECURSOS RELACIONADOS

- Anger, H.A., Durocher, J., Dabash, R., Hassanein, N., Ononge, S., Burkhardt, G., Frye, J.L., Diop, A., Beye Diop, S.B.M., Darwish, E., Ramadan, C.M., Kayaga, J., Charles, D., Gaye, A., Eckardt, M., Winikoff, B. [Postpartum Infection, Pain and Experiences with Care among Women Treated for Postpartum Hemorrhage in Three African Countries: A Cohort Study of Women Managed with and without Condom-catheter Uterine Balloon Tamponade.](#) PLoS One; 2021 Feb 8; 16(2).
- Mary, M., Jafarey, S., Dabash, R., Kamal, I., Rabbani, A., Abbas, D., Durocher, J., Tan, Y.L., Beverly, W. [The Safety and Feasibility of a Family First Aid Approach for the Management of Postpartum Hemorrhage in Home Births: A Pre-Post Intervention Study in Rural Pakistan.](#) Matern Child Health J; 2020 Nov 26.
- Abbas, D., Mirzazada, S., Durocher, J., Pamiri, S., Bryne, M.E., Winikoff, B. [Testing a Home-Based Model of Care Using Misoprostol for Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage: Results From a Randomized Placebo-Controlled Trial Conducted in Badakhshan Province, Afghanistan.](#) Reprod Health; 2020 June 5; Vol. 17(1):88.
- Anger, H., Dabash, R., Hassanein, N., Darwish, E., Cherine Ramadan, M., Nawar, M., Charles, D., Breebaart, M., Winikoff, B. [A Cluster-Randomized, Non-Inferiority Trial Comparing Use of Misoprostol for Universal Prophylaxis vs. Secondary Prevention of Postpartum Hemorrhage Among Community Level Births in Egypt.](#) BMC Pregnancy Childbirth; 2020 May 24; Vol. 20:317.
- Durocher, J., Daniel Aguirre, J., Dzuba, I.G., Mirta Morales, E., Carroli, G., Esquivel, J., Martin, R., Berecochea, C., Winikoff, B. [High Fever After Sublingual Administration of Misoprostol for Treatment of Post-Partum Haemorrhage: A Hospital-Based, Prospective Observational Study in Argentina.](#) Trop Med Int Health; 10 March 2020; Vol. 25(6):714-722.
- Diop, A., Abbas, D., Ngoc, N.T.N., Martin, R., Razafi, A., Tuyet, H.D., Winikoff, B. [A Double-Blind, Randomized Controlled Trial to Explore Oral Tranexamic Acid as Adjunct for the Treatment for Postpartum Hemorrhage.](#) Reprod Health; 2020 Mar 6; Vol. 17(1):3.
- Mary, M., Diop, A., Sheldon, W., R., Yenikoye, A., Winikoff, B. [Scaling up Interventions: Findings and Lessons Learned from an External Evaluation of Niger's National Initiative to Reduce Postpartum Hemorrhage.](#) BMC Pregnancy and Childbirth; 24 October 2019; Vol. 19:(379).
- Durocher, J., Dzuba, I., Carroli, G., Mirta Morales, E., Aguirre, J. D., Martin, R., Esquivel, J., Carroli, B., Winikoff, B. [Does Route Matter? Impact of Route of Oxytocin Administration on Postpartum Bleeding: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial.](#) PLOS ONE; October 1, 2019.
- Anger, H., Durocher, J., Dabash, R., Winikoff, B. [How Well do Postpartum Blood Loss and Common Definitions of Postpartum Hemorrhage Correlate with Postpartum Anemia and Fall In Hemoglobin?](#) PLOS ONE; August 22, 2019.
- Anger, H.A., Dabash, R., Durocher, J., Hassanein, N., Ononge, S., Frye, L.J., Diop, A., Beye S.B., Burkhardt, G., Darwish, E., Ramadan, M.C., Kayaga, J., Charles D., Gaye, A., Eckardt, M., Winikoff, B. [The Effectiveness and Safety of Introducing Condom-Catheter Uterine Balloon Tamponade for Postpartum Haemorrhage at Secondary Level Hospitals in Uganda, Egypt, and Senegal: a Stepped Wedge, Cluster-Randomised Trial.](#) BJOG; 13 August 2019.
- Abbas, D.F., Jehan, N., Diop, A., Durocher, J., Byrne, M.E., Zuberi, N., Ahmed, Z., Walraven, G., Winikoff, B. [Using Misoprostol to Treat Postpartum Hemorrhage in Home Deliveries Attended by Traditional Birth Attendants.](#) Randomized Controlled Trial Int J Gynaecol Obstet; 2019 Jan 24; Vol. 144(3):290-296.
- Charles, D., Anger, H., Dabash, R., Darwish, E., Ramadan, M.C., Mansy, A., Salem, Y., Dzuba, I.G., Byrne, M.E., Breebaart, M., Winikoff, B. [Intramuscular Injection, Intravenous Infusion, and Intravenous Bolus of Oxytocin in the Third Stage of Labor for Prevention of Postpartum Hemorrhage: A Three-Arm Randomized Control Trial.](#) BMC Pregnancy Childbirth; 2019 Jan 18; 9(1):38.
- Borovac-Pinheiro, A., Pacagnella, R.C., Cecatti, J.G., Miller, S., El Ayadi, A.M., Souza, J.P., Durocher, J., Blumenthal, P.D., Winikoff, B. [Postpartum Hemorrhage: New Insights for Definition and Diagnosis.](#) Am J Obstet Gynecol; 2018 Aug; 219(2):162-168.

- Meher, S., Cuthbert, A., Kirkham, J.J., Williamson, P., Abalos, E., Aflaifel, N., Bhutta, Z. A., Bishop, A., Blum, J., Collins, P., Devane, D., Ducloy-Bouthors, A-S., Fawole, B., Gülmезoglu, A.M., Gutteridge, K., Gyte, G., Homer, C.S.E., Mallaiah, S., Smith, J.M., Weeks, A.D., Alfirevic, Z. [Core Outcome Sets for Prevention and Treatment of Postpartum Haemorrhage: An International Delphi Consensus Study.](#) BJOG; 19 June 2018; Vol. 20:317.
- Ditai, J., Frye, L.J., Durocher, J., Byrne, M.E., Ononge, S., Winikoff, B., Weeks, D. [Achieving Community-Based Postpartum Follow Up in Eastern Uganda: The Field Experience From the MamaMiso Study on Antenatal Distribution of Misoprostol.](#) BMC Res Notes; 2017 Oct 26; Vol. 10(1):516.
- Rajbhandari, S.P., Aryal, K., Sheldon, W.R., Ban, B., Upreti, S.R., Regmi, K., Aryal, S., Winikoff, B. [Postpartum Hemorrhage Prevention in Nepal.](#) BMC Pregnancy and Childbirth; 05 June 2017; Vol. 17: 169.
- Durocher, J., Frye, L.J., Winikoff, B. [Profound Hyperthermia After Postpartum Rectal Misoprostol Administration.](#) Obstet Gynecol; 2016 Oct; 128(4):908.
- Diop, A., Daff, B., Sow, M., Blum, J., Diagne, M., Sloan, N.L., Winikoff, B. [Oxytocin via Uniject versus Oral Misoprostol for Prevention of Postpartum Haemorrhage.](#) Lancet Glob Health; 2016 Jan; 4(1):e37-44.
- Raghavan, S., Geller, S., Miller, S., Goudar, S.S., Anger, H., Yadavannavar, M.C., Dabash, R., Bidri, S.R., Gudadinni, M.R., Udgiri, R., Koch, A.R., Bellad, M.B., Winikoff, B. [Misoprostol for Primary versus Secondary Prevention of Postpartum Haemorrhage: A Cluster-Randomised Non-Inferiority Community Trial.](#) BJOG; 2016 Jan; 123(1): 120-7.
- Diop, A., Daff, B., Sow, M., Blum, J., Diagne, M., Sloan, N.L., Winikof, B. [Oxytocin in Uniject™ versus Misoprostol for Prevention of Postpartum Hemorrhage at the Community Level: A Cluster Randomized Controlled Trial.](#) Lancet Global Health; 2016 Jan; 4(1): e37-44.
- Weeks, A.D., Ditai, J., Ononge, S., Faragher, B., Frye, L.J., Durocher, J., Mirembe, F.M., Byamugisha, J., Winikoff, B., Alfirevic, Z. [The MamaMiso Study of Self-Administered Misoprostol to Prevent Bleeding After Childbirth in Uganda.](#) BMC Pregnancy Childbirth; 14 September 2015; 14:15:219.
- Alfirevic, A., Durocher, J., Elati, A., León, W., Dickens, D., Rädisch, S., Box, H., Siccardi, M., Curley, P., Xinarianos, G., Ardeshana, A., Owen, A., Zhang, J.E., Pirmohamed, M., Alfirevic, Z., Weeks, A., Winikoff, B. [Misoprostol-Induced Fever is Related to Genetic Polymorphisms in Drug Transporters SLC01B1 and ABCC4 in Women of Latin American and European Ancestry.](#) Pharmacogenomics; June 30, 2015; 16(9):919-28.
- Ambardekar, S., Shochet, T., Bracken, H., Coyaji, K., Winikoff, B. [Calibrated Delivery Drape versus Indirect Gravimetric Technique for the Measurement of Blood Loss after Delivery: A Randomized Trial.](#) BMC Pregnancy Childbirth; 2014 Aug 15; 14:276.
- Winikoff, B. [Commentary: Evidence versus Influence in the WHO Procedure for Approving Essential Medicines: Misoprostol for Maternal Health.](#) BMJ; 2014 Jul 31; 349:g4823.
- Sheldon, W., Blum, J., Vogel, J., Souza, J., Gülmезoglu, A., Winikoff, B. [Postpartum Haemorrhage Management, Risks, and Maternal Outcomes: Findings From the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health.](#) BJOG; 2014 Mar; 121 Suppl 1:5-13.
- Mousa, H.A., Blum, J., Abou El Senoun, G., Shakur, H., Alfirevic, Z. [Treatment for Primary Postpartum Haemorrhage.](#) Cochrane Database Syst Rev; 2014 Feb 13; 2014(2).
- Winikoff, B., Durocher, J. [A New Formulation of Misoprostol Is Unlikely To Revolutionise Postpartum Haemorrhage Care.](#) Evid Based Med; 2013 Aug; 18(4):143-4.
- Pacagnella, R.C., Souza, J.P., Durocher, J., Perel, P., Blum, J., Winikoff, B., Gülmезoglu, A.M. [A Systematic Review of the Relationship Between Blood Loss and Clinical Signs.](#) PLoS One March 6, 2013; 8(3): e57594.
- Sheldon, W.R., Durocher, J., Winikoff, B., Blum, J., Trussell, J. [How Effective Are the Components of Active Management of the Third Stage of Labor?](#) BMC Pregnancy Childbirth; Published online 2013 Feb 21; 13:46.
- Dabash, R., Dzuba, I., Winikoff, B. [Sublingual Misoprostol for the Treatment of Postpartum Hemorrhage.](#) Global Library of Women's Medicine; A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. Sapiens Publishing, 2012.

- Dabash, R., Blum, J., Raghavan, S., Anger, H., Winikoff, B. [Misoprostol for the Management of Postpartum Bleeding: A New Approach](#). *Int J Gynaecol Obstet*; 2012 Dec; 119(3): 210-2.
- Raghavan, S., Abbas, D., Winikoff, B. [Misoprostol for Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage: What Do We Know? What Is Next?](#) *Int J Gynaecol Obstet*; 2012 Oct; 119(I):S35-8.
- León, W., Durocher, J., Barrera, G., Pinto, E., Winikoff, B. [Dose and Side Effects of Sublingual Misoprostol for Treatment of Postpartum Hemorrhage: What Difference Do They Make?](#) *BMC Pregnancy Childbirth*; 2012 Jul 7; 12: 65.
- Sheldon, W.R., Blum, J., Durocher, J., Winikoff, B. [Misoprostol for the Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage](#). *Expert Opin Investig Drugs*; 2012 Feb; 21(2): 235-50.
- Oladapo, O.T., Fawole, B., Blum, J., Abalos, E. [Advance Misoprostol Distribution for Preventing and Treating Postpartum Haemorrhage](#). *Cochrane Database Syst Rev*; 2012 Feb 15; (2).
- Starrs, A., Winikoff, B. [Misoprostol for Postpartum Hemorrhage: Moving from Evidence to Practice](#). *Int J Gynaecol Obstet*; 2012 Jan; 116(1): 1-3.
- Hofmeyr, G.J., Fawole, B., Mugerwa, K., Godi, N.P., Blignaut, Q., Mangesi, L., Singata, M., Brady, L., Blum, J. [Administration of 400 µg of Misoprostol to Augment Routine Active Management of the Third Stage of Labor](#). *Int J Gynaecol Obstet*; 2011 Feb; 112(2):102.
- Mobeen, N., Durocher, J., Zuberi, N.F., Jahan, N., Blum, J., Wasim, S., Walraven, G., Hatcher, J. [Administration of Misoprostol by Trained Traditional Birth Attendants to Prevent Postpartum Haemorrhage in Homebirths in Pakistan: A Randomised Placebo-Controlled Trial](#). *BJOG*; 2011 Feb; 118(3): 353-61.
- Sloan, N., Durocher, J., Aldrich, T., Blum, J., Winikoff, B. [What Measured Blood Loss Tells Us About Postpartum Bleeding: A Systematic Review](#). *BJOG*; 2010 Jun; 117(7): 788-800.
- Durocher, J., Bynum, J., León, W., Barrera, G., Winikoff, B. [High Fever Following Postpartum Administration of Sublingual Misoprostol](#). *BJOG*; 2010 June; 117(7): 845-52.
- Widmer, M., Blum, J., Hofmeyr, G.J., Carroli, G., Abdel-Aleem, H., Lumbiganon, P., Ngoc, N.T.N., Wojdyla, D., Thinkhamrop, J., Singata, M., Mignini, L.E., Abdel-Aleem, M.A., Thach, T.S., Winikoff, B. [Misoprostol as an Adjunct to Standard Uterotonics for Treatment of Post-Partum Haemorrhage: A Multicentre, Double-Blind Randomised Trial](#). *The Lancet*; May 22, 2010; Vol. 375(9728): 1808-13.
- Blum, J., Winikoff, B., Raghavan, R., Dabash, R., Cherine Ramadan, M., Dilbaz, B., Dao, B., Durocher, J., Yalvac, S., Diop, A., Dzuba, I.G., Ngoc, N.T.N. [Treatment of Post-Partum Haemorrhage with Sublingual Misoprostol Versus Oxytocin in Women Receiving Prophylactic Oxytocin: A Double-Blind, Randomised, Non-Inferiority Trial](#). *The Lancet*; January 16, 2010; Vol. 375(9710): 217-23.
- Winikoff, B., Dabash, R., Durocher, J., Darwish, E., Ngoc, N.T.N., León, W., Raghavan, S., Medhat, I., Chi, H.T.K., Barrera, G., Blum, J. [Treatment of Post-Partum Haemorrhage with Sublingual Misoprostol Versus Oxytocin in Women Not Exposed to Oxytocin During Labour: A Double-Blind, Randomised, Non-Inferiority Trial](#). *The Lancet*; January 16, 2010; Vol. 375(9710): 210-216.
- Zuberi, N.F., Durocher, J., Sikander, R., Baber, N., Blum, J., Walraven, G. [Misoprostol in Addition to Routine Treatment of Postpartum Hemorrhage: A Hospital-Based Randomized-Controlled Trial in Karachi, Pakistan](#). *BMC Pregnancy Childbirth*; 2008 Aug 21; 8:40.
- Alfirevic, Z., Blum, J., Walraven, G., Weeks, A., Winikoff, B. [Prevention of Postpartum Hemorrhage with Misoprostol](#). *Int J Gynaecol Obstet*; 2007 Dec; 99(Suppl 2): S198-201.
- Blum J, Alfirevic Z, Walraven G, Weeks A, Winikoff B. [Treatment of Postpartum Hemorrhage with Misoprostol](#). International Journal of Gynecology and Obstetrics; December 2007; Vol. 99:S202-S205.
- Walraven, G., Blum, J., Dampha, Y., Sowe, M., Morison, L., Winikoff, B., Sloan, N. [Misoprostol in the Management of the Third Stage of Labour in the Home Delivery Setting in Rural Gambia: A Randomised Controlled Trial](#). *BJOG*; 2005 Sep; 112(9): 1277-83.