



INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y OPERATIVA

En colaboración con investigadores y proveedores de atención clínica de Estados Unidos y otras partes del mundo, Gynuity realiza investigación sobre temas esenciales de la salud de las mujeres para disminuir la morbilidad y mortalidad asociadas a algunos de los problemas que les afectan de manera más significativa, como son el aborto inseguro y la hemorragia postparto. Trabajamos principalmente en escenarios de bajos recursos, donde el acceso a servicios médicos puede representar un reto.

Entre los objetivos específicos de la investigación clínica y operativa que llevamos a cabo se encuentran:

- Afinar protocolos clínicos para tecnologías de salud reproductiva existentes a fin de mejorar su facilidad de uso, seguridad y aceptabilidad, a la vez de reducir costos,
- Evaluar esquemas terapéuticos en diferentes contextos y escenarios de prestación de servicios,
- Proporcionar a mujeres y proveedores de salud la oportunidad de conocer y evaluar tecnologías nuevas,
- Generar datos para documentos reguladores y trabajar con agencias relevantes.

El mapa que se presenta a continuación muestra los países y áreas temáticas en los que trabajamos actualmente o en donde hemos concluido estudios de investigación.



ESTUDIOS EN CURSO

PAÍSES DONDE SE
DESARROLLAN LOS PROYECTOS

Aborto con medicamentos

Expansión de opciones con mifepristona para el aborto con medicamentos en etapas tempranas del embarazo

- Administración de 400 mcg de misoprostol por vía bucal después de 200 mg de mifepristona en embarazos de hasta 63 días a partir de la FUM República de Georgia
- Exploración de alternativas a la visita rutinaria de seguimiento requerida después de un aborto con medicamentos en etapas tempranas del embarazo México, Moldavia, Túnez, Reino Unido, Uzbekistán
- Comparación de dos esquemas terapéuticos con ibuprofeno para minimizar el dolor consecuencia de un aborto con medicamentos realizado en el primer trimestre Estados Unidos

Esquemas de aborto con medicamentos para la interrupción del embarazo en el segundo trimestre

- “Estudio piloto” para explorar la efectividad de un esquema terapéutico ambulatorio de aborto con medicamentos a los 71-77 días de gestación Vietnam
- Aceptabilidad y viabilidad de un esquema de mifepristona y misoprostol para la normalización de la menstruación en centros de salud del sector público Bangladesh

Falla de embarazo y aborto espontáneo

Uso de misoprostol en la atención postaborto

- Introducción del uso de misoprostol como tratamiento de primera línea del aborto incompleto Ecuador, Egipto, México, Senegal

Hemorragia postparto

Uso de misoprostol para la prevención de la hemorragia postparto

- Estudio de dos estrategias para la prevención de la HPP a nivel comunitario: Misoprostol y oxitocina en Uniject™ India, Mali, Senegal, Vietnam
- Colaboración con las Universidades de Liverpool y de Makerere, Uganda: Estudio piloto de la seguridad y eficacia de la auto-administración del misoprostol oral (600 mcg) comparado con placebo, en partos atendidos en casa, para la prevención de la HPP Uganda
- Dos estrategias comunitarias para comparar el uso de misoprostol para la prevención secundaria de la hemorragia postparto con el uso de profilaxis universal (prevención primaria) Egipto, India
- Efecto de la vía de administración (intravenosa vs. intramuscular) de 10 UI de oxitocina en la pérdida media de sangre en hospitales de atención terciaria, donde de acuerdo con la política institucional se requiera el uso de oxitocina profiláctica en la tercera etapa del parto Ecuador, Turquía, Vietnam

ESTUDIOS EN CURSO

PAÍSES DONDE SE
DESARROLLAN LOS PROYECTOS**Hemorragia postparto (continúa)***Uso de misoprostol para el tratamiento de la hemorragia postparto*

- Comparación del uso de 800 mcg de misoprostol sublingual vs. placebo + atención estándar (nivel de atención primaria) Egipto
- Comparación del uso de 800 mcg de misoprostol sublingual + atención estándar vs. placebo + atención estándar después de 600 mcg de misoprostol como profilaxis de la HPP (nacimientos en casa) Afganistán, Pakistán
- Valoración de la fiebre después de la administración de misoprostol para el tratamiento de la HPP Latinoamérica

Preeclampsia*Estudio (INFORM) sobre la inducción del parto con misoprostol o la sonda de Foley*

- Colaboración con la Universidad de Liverpool y la Facultad de Medicina del Gobierno, Nagpur, para comparar el uso del globo sonda de Foley con la administración de misoprostol oral para la inducción del parto en mujeres con preeclampsia India

Uso de esquemas terapéuticos antihipertensivos por vía oral para el manejo de la hipertensión aguda en el embarazo

- Colaboración con la Universidad de Columbia Británica y la Facultad de Medicina del Gobierno, Nagpur, para comparar la eficacia, seguridad y efectos secundarios de nifedipina, metildopa y labetalol para el manejo de la hipertensión en embarazadas India

ITS/VIH/enfermedades infecciosas*Colonización por clostridium sordellii y clostridium perfringens*

- Cálculo de la prevalencia e incidencia de colonización vaginal y rectal en mujeres de edad reproductiva Estados Unidos
- Evaluación de los cambios en la colonización vaginal y rectal por clostridia después de un aborto quirúrgico y de uno con medicamentos Estados Unidos
- Medición del cumplimiento con un esquema de antibióticos y de sus efectos secundarios después de un aborto con medicamentos Estados Unidos

ESTUDIOS CONCLUIDOS

Aborto con medicamentos

Expansión de opciones con mifepristona para el aborto con medicamentos en etapas tempranas del embarazo

Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Ghana, India, México, Moldavia, Mozambique, Nepal, Nigeria, Puerto Rico, República de Georgia, Túnez, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Uzbekistán, Vietnam

Esquemas de aborto con medicamentos para la interrupción del embarazo en el segundo trimestre

Moldavia, Túnez, Vietnam

Falla de embarazo y aborto espontáneo

Uso de misoprostol en la atención postaborto

Burkina Faso, Ecuador, Egipto, Ghana, Guatemala, India, Kenia, Madagascar, Mauritania, Moldavia, Mozambique, Níger, Nigeria, Senegal, Tanzania, Venezuela, Vietnam

Uso de misoprostol en casos de muerte fetal intrauterina en el segundo trimestre

Estados Unidos, Vietnam

Hemorragia postparto

Uso de misoprostol para la prevención de la hemorragia postparto

Pakistán

Uso de misoprostol para el tratamiento de la hemorragia postparto

Burkina Faso, Ecuador, Egipto, Turquía, Vietnam

Uso de misoprostol para el tratamiento complementario de la hemorragia postparto

Argentina, Egipto, Sudáfrica, Tailandia, Vietnam

Técnicas de mediciones de sangre

India

Preeclampsia

Uso de sulfato de magnesio para el tratamiento de la preeclampsia

India

ITS/VIH/enfermedades infecciosas

Productos para la salud vaginal controlados por la mujer

Estados Unidos

Si desea consultar una lista detallada de los protocolos de estudios concluidos, por favor escriba a pubinfo@gynuity.org. Le invitamos a visitar nuestro sitio web donde encontrará información adicional sobre nuestras actividades de investigación; en la sección de Recursos presentamos los resúmenes de artículos publicados de muchos de los estudios que ya han finalizado.

Junio de 2012