



RECHERCHE CLINIQUE ET OPÉRATIONNELLE

Gynuity collabore avec des chercheurs et des prestataires de soins cliniques aux États-Unis et à l'échelle internationale en vue de mener des recherches sur les questions cruciales relatives à la santé des femmes. Notre but consiste à réduire la morbidité et la mortalité relatives à l'un des problèmes les plus cruciaux auxquels les femmes sont confrontées, tels que l'avortement dans des conditions insalubres et l'hémorragie du post-partum. Nous intervenons principalement dans les milieux démunis où l'accès aux soins de santé adéquats peut être difficile.

Certains des objectifs spécifiques de nos recherches cliniques consistent à :

- améliorer les protocoles cliniques pour les technologies de santé génésique existantes en vue d'accroître la convenance, l'innocuité, l'acceptabilité et de réduire les coûts,
- tester les traitements dans divers contextes et établissements de prestation de services,
- fournir aux femmes et aux prestataires de santé l'opportunité de s'initier aux nouvelles technologies et de les évaluer, et
- recueillir des données pour les classements réglementaires et à travailler avec les organismes de réglementation.

La carte suivante met en relief les pays et les sujets sur lesquels nous travaillons ou avons mené des recherches.



RECHERCHES EN COURS

PAYS-PROJETS

Avortement médicamenteux

Mise au point d'options avec la mifépristone pour l'avortement médicamenteux au stade précoce

- Dépistage simplifié d'avortement médicamenteux : un projet démonstration pilote
Moldavie, É.-U.
- L'utilisation des tests de grossesse semi-quantitatifs après un avortement médicamenteux au stade précoce
Bolivie, Mexique, Inde, Tunisie, É.-U.
- L'avortement médicamenteux ambulatoire par 77 jours de gestation
Azerbaïdjan, Mexique, République de Géorgie, É.-U., Vietnam
- Études pilotes d'avortement médicamenteux ambulatoire à 71 à 84 jours d'aménorrhée
Tunisie, Vietnam
- L'acceptabilité et la faisabilité de la mifépristone + le misoprostol pour la régulation menstruelle dans les établissements du secteur publique au Bangladesh

Schémas posologiques de l'avortement médicamenteux pour l'interruption de grossesse au second trimestre

- L'efficacité de mifépristone et des doses répétées de misoprostol pour l'avortement médicamenteux à 13 à 22 semaines de gestation
Ukraine, Ouzbékistan
- Essai contrôle randomisé comparant des schémas misoprostol sublingual et buccal après la mifépristone pour l'avortement à 13 à 22 semaines de gestation
Arménie, Népal, Tunisie

Échec de grossesse et avortement spontané

Le traitement de la grossesse arrêtée

- Comparaison de la mifépristone et le misoprostol contre le misoprostol seul pour le traitement des grossesses arrêtées (au niveau tertiaire)
Gabon, Pakistan, Argentine, Mexique

Le misoprostol pour la mort fœtale intra-utérine

- La mifépristone et le misoprostol contre le misoprostol seul pour le traitement de la mort fœtale à 14 à 28 semaines de gestation : une étude randomisée, contrôlée contre placebo, en double aveugle
Vietnam

Le misoprostol pour les soins après avortement

- Introduction de misoprostol comme traitement de première intention pour l'avortement incomplet
Équateur, Égypte, Mexique, Myanmar, Sénégal

RECHERCHES EN COURS

PAYS-PROJETS

Avortement médicamenteux

Mise au point d'options avec la mifépristone pour l'avortement médicamenteux au stade précoce

- Dépistage simplifié d'avortement médicamenteux : un projet démonstration pilote
- L'utilisation des tests de grossesse semi-quantitatifs après un avortement médicamenteux au stade précoce
- L'avortement médicamenteux ambulatoire par 77 jours de gestation

Moldavie, É.-U.

Bolivie, Mexique, Inde, Tunisie, É.-U.

Azerbaïdjan, Mexique, République de Géorgie, É.-U., Vietnam

Tunisie, Vietnam

- Études pilotes d'avortement médicamenteux ambulatoire à 71 à 84 jours d'aménorrhée
- L'acceptabilité et la faisabilité de la mifépristone + le misoprostol pour la régulation menstruelle dans les établissements du secteur publique au Bangladesh

Bangladesh

Schémas posologiques de l'avortement médicamenteux pour l'interruption de grossesse au second trimestre

- L'efficacité de mifépristone et des doses répétées de misoprostol pour l'avortement médicamenteux à 13 à 22 semaines de gestation
- Essai contrôle randomisé comparant des schémas misoprostol sublingual et buccal après la mifépristone pour l'avortement à 13 à 22 semaines de gestation

Ukraine, Ouzbékistan

Arménie, Népal, Tunisie

Échec de grossesse et avortement spontané

Le traitement de la grossesse arrêtée

- Comparaison de la mifépristone et le misoprostol contre le misoprostol seul pour le traitement des grossesses arrêtées (au niveau tertiaire)

Gabon, Pakistan, Argentine, Mexique

Le misoprostol pour la mort fœtale intra-utérine

- La mifépristone et le misoprostol contre le misoprostol seul pour le traitement de la mort fœtale à 14 à 28 semaines de gestation : une étude randomisée, contrôlée contre placebo, en double aveugle

Vietnam

Le misoprostol pour les soins après avortement

- Introduction de misoprostol comme traitement de première intention pour l'avortement incomplet

Équateur, Égypte, Mexique, Myanmar, Sénégal

RECHERCHES MENEES A TERME**Avortement médicamenteux***Schémas posologiques pour l'avortement médicamenteux au premier trimestre*

Croissant l'acceptabilité et l'accessibilité : Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, É.-U., Ghana, Inde, Moldavie, Mozambique, Mexique, Kazakhstan, Népal, Nigéria, Ouzbékistan, Porto Rico, République de Géorgie, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam

Mesurer l'adhésion et les effets secondaires associés avec l'utilisation d'antibiotiques suivant l'avortement médicamenteux

É.-U.

Comparaison de deux régimes d'ibuprofène pour minimiser la douleur dans l'avortement médicamenteux au premier trimestre

É.-U.

Utilisation à domicile de mifépristone pour l'avortement médicamenteux

Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Népal, République de Géorgie, É.-U.

Alternatives à visite de suivi routinière après l'avortement médicamenteux au stade précoce

Mexique, Moldavie, Tunisie, Royaume-Uni, Ouzbékistan

Comparant régimes de mifépristone-misoprostol aux régimes de misoprostol seul dans le deuxième trimestre

Moldavie, Tunisie, Vietnam

Essai contrôlé randomisé comparant la posologie de mifépristone et misoprostol initiée simultanément contre un intervalle de 24 heures pour les avortements 13 à 22 semaines d'aménorrhée

Vietnam

Échec de grossesse et avortement spontané*Le misoprostol pour les soins après avortement*

Burkina Faso, Égypte, Équateur, Ghana, Guatemala, Inde, Kenya, Madagascar, Mauritanie, Moldavie, Mozambique, Niger, Nigéria, Sénégal, Tanzanie, Venezuela, Vietnam

Le misoprostol pour la mort fœtale intra-utérine au deuxième trimestre

É.-U., Vietnam

Hémorragie du post-partum*Le misoprostol pour la prévention de l'hémorragie du post-partum*

Pakistan, Ouganda

Le misoprostol pour le traitement de l'hémorragie du post-partum

Burkina Faso, Égypte, Équateur, Turquie, Vietnam

Le misoprostol pour le traitement auxiliaire de l'hémorragie du post-partum

Afrique du Sud, Argentine, Égypte, Thaïlande, Vietnam

Mesure du volume de pertes sanguines

Inde

Pré-éclampsie*Sulfate de magnésium pour le traitement de pré-éclampsie*

Inde

IST/VIH/ Maladie infectieuse*Les produits contrôlés par des femmes pour la santé vaginale*

É.-U.

Transport de Clostridium sordellii et Clostridium perfringens

É.-U.

Contactez pubinfo@gynuity.org pour une liste complète des protocoles de recherche. Visitez la section Ressource dans notre site internet pour plus amples informations sur nos activités de recherche actuels et les abstracts des articles publiés dans les revues scientifiques.

Août 2015